

## MR I 検査を受けられる方へ 予約票

ID

氏名 様

生年月日

### 検査を受けられる患者様へ

(1) 検査の日時および部位、食事制限は下記のとおりです。

【検査日時】

【部位】

【方法】

- 食事・水分制限無し
- 造影検査：検査3時間前から絶食、水分は制限なし
- 胆嚢、すい臓、MRCP の場合：検査3時間前から絶飲食

(2) 当日はこの予約票を持って予約時間の10分前までに放射線科受付にお越しください。入院患者様は、連絡があるまでお待ちください。

(3) 入院された場合には、この用紙を病棟スタッフに提出してください。

(4) 検査を中止・変更される場合は、必ず放射線科受付までご連絡のうえ、ご相談ください。

(5) 緊急検査などにより、開始時間がずれることがありますのでご了承ください。

### MRI 検査上の注意事項

(1) 検査は原則、痛みを伴いませんが、大きな音がし身体を動かせないなどの制約があります。

(2) 検査の所要時間は20分～1時間です。

(3) 心臓ペースメーカー・人工内耳・眼球内金属（磁性体）・脊髄刺激装置・深部脳刺激装置をつけておられる患者様・妊娠4か月未満の患者様は検査を受けることができません。

(4) 体内の金属物（脳動脈クリップ、心臓人工弁、プレート、ステント、人工骨頭・関節刺青、アートメイクなど）を有する患者様は検査ができない場合があります。

(5) アイシャドー、マスカラ、アイライン、ネイルアート等、検査時はしないでください。

(6) コンタクトレンズは外して検査をお受けください。（コンタクトの収納容器をご持参ください）

(7) ヘヤピン、ピアス、ネックレス、入れ歯、補聴器、キャッシュカード、使い捨てカイロ、腕時計、エレキバン、メガネ、携帯電話、ニトロゲームは事前に取り外して検査室には持ち込まないでください。

### 造影剤使用時の注意事項

(1) MRI 検査の造影剤は安全な薬ですが、まれに副作用があらわれることがあります。副作用があらわれた場合は担当者が速やかに対応します。副作用の症状には次のようなものがあります。

軽度：吐き気、嘔吐 熱感 じんま疹 腰背部痛 など

重度：ショック（血圧低下）呼吸困難 けいれん など（2万人に1人程度）

極めてまれですが、80万人に1人の割合で死亡に至る例もあります。

(2) 造影剤の副作用を避けるため、検査前に水やお茶などの水分を十分とってください。また、造影剤の速やかな排泄を促すため、造影剤使用後は水分を多めにとってください。

(3) 造影剤は静脈内に注射しますが、造影剤が血管外に漏れやすい体質の方がおられます。漏れた造影剤は時間とともに吸収されますが、必要に応じて処置を行う場合があります。

国立病院機構 兵庫中央病院 放射線科受付

079-563-2121 内線570

